

Vragen en antwoorden over de vergoeding van farmacotherapie in de behandeling van overgewicht en obesitas

Versie 12 oktober 2026

Bij overgewicht en obesitas volgt de voorschrijver de van kracht zijnde richtlijn: zie www.behandelovergewicht.nl. Behandeling van de verzekerde met farmacotherapie wordt door de voorschrijver derhalve in lijn met de hiervoor genoemde richtlijn afgewogen en voorgeschreven.

Tabel 1. Overzicht kenmerken van beschikbare vergoede medicijnen in de totale behandeling van overgewicht en obesitas

Kenmerk			Toelichting
Product	Meerdere fabrikanten* met verschillende merknamen waaronder Saxenda ^{®1}	Mysimba ^{®2}	
Werkzame stof(fen)	Liraglutide 3 mg	naltrexon-bupropion (N-B)	
Vergoedingsvoorwaarden	Volwassenen (18 jaar en ouder): - BMI ≥ 35 kg/m ² in combinatie met een co-morbiditeit (hart- en vaatziekte, slaapapneu en/of artrose) <u>ó</u> f - BMI ≥ 40 kg/m ² . - en géén diabetes type 2 - en nog niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie - en deelnemen aan een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)*	Volwassenen (18 jaar en ouder): - BMI ≥ 27 tot 30 kg/m ² in combinatie met een co-morbiditeit ((risicofactoren voor) hart- en vaatziekte, diabetes type 2, slaapapneu en/of artrose) <u>ó</u> f - BMI ≥ 30 kg/m ² - en deelnemen aan een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)*	

*: voor een actueel overzicht van de producten voor deze indicatie (onder indicaties): <https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/l/liraglutide>

	Stopregel i.v.m. geen te verwachten effect van dit medicijn voor betreffende patiënt: de behandeling dient te worden gestaakt indien na <u>3 maanden</u> gebruik het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen. * Aanvullende gepast gebruik afspraak: Inzet van liraglutide 3 mg kan <u>alleen overwogen worden indien een GLI niet succesvol is na één jaar behandeling</u> (zie hiervoor www.behandelovergewicht.nl). Vanwege het nog niet voorhanden zijn van erkende intensieve GLI (GLI+) programma's, wordt in dezen de inzet van obesitas medicatie gekoppeld aan de in de Zorgstandaard Obesitas 2010 geldende voorwaarde bij een erkend GLI programma: "pas als een GLI niet succesvol is na 1 jaar, kan obesitas medicatie overwogen worden." Volledig rapport incl. toelichting gestelde vergoedingsvoorwaarden door het Zorginstituut Nederland (ZINL)⁴: zie hier	Stopregel i.v.m. geen te verwachten effect van dit medicijn voor betreffende patiënt: de behandeling dient te worden gestaakt indien na <u>4 maanden</u> gebruik het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen. * Aanvullende gepast gebruik afspraak: Inzet van naltrexon-bupropion (Mysimba®) kan <u>alleen overwogen worden indien een GLI niet succesvol is na één jaar behandeling</u> (zie hiervoor www.behandelovergewicht.nl). Vanwege het nog niet voorhanden zijn van erkende intensieve GLI (GLI+) programma's, wordt in dezen de inzet van obesitas medicatie gekoppeld aan de in de Zorgstandaard Obesitas 2010 geldende voorwaarde bij een erkend GLI programma: "pas als een GLI niet succesvol is na 1 jaar, kan obesitas medicatie overwogen worden." Volledig rapport incl. toelichting gestelde vergoedingsvoorwaarden door het Zorginstituut Nederland (ZINL)⁴: zie hier	Inclusief de opbouwfase geldt voor beide middelen dat er een evaluatiemoment plaatsvindt na 16 weken. Indien de patiënt <5% van zijn of haar aanvankelijke lichaamsgewicht heeft verloren dient de behandeling gestaakt te worden (Stopregel)
Farmaceutische vorm	Injectie subcutaan - 6 mg/ml oplossing. Een pen bevat 18 mg liraglutide en levert doses van 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg en 3,0 mg.	Tablet met gereguleerde afgifte - bevat 8 mg naltrexon-HCL (N), en 90 mg Bupropion-HCL (B)	
Aanbevolen (onderhoud)dosering	3 mg 1x per dag (0,5 ml)	2x daags 2 tabletten bij de maaltijd	Beide middelen moeten gedurende 4 weken worden opgebouwd tot de aanbevolen dosering
Kosten per verpakking (AIP) ³	€ 229,80	€ 98,95	

*: voor een actueel overzicht van de producten voor deze indicatie (onder indicaties): <https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/l/liraglutide>

Praktische gebruiksaanwijzing	Bewaren in de koelkast (2°C–8°C). Niet in de vriezer bewaren. Niet in de buurt van het vriesvak bewaren. Na ingebruikname: Bewaren beneden 30°C of bewaren in de koelkast (2°C–8°C). Laat de pendop op de pen ter bescherming tegen licht.	Bewaren beneden 30°C	
--	---	----------------------	--

Referenties:

- 1 www.CBG-MEB.nl geneesmiddeleninformatiebank website geraadpleegd juli 2022 –SPC Saxenda
- 2 www.CBG-MEB.nl geneesmiddeleninformatiebank website geraadpleegd juli 2022 –SPC Mysimba
- 3 www.z-index.nl website geraadpleegd jan 2023

Overig:

www.zorginstituutnederland.nl website geraadpleegd juli 2022 publicaties GVS adviezen Saxenda en Mysimba
www.znformulieren.nl website farmacie geraadpleegd juli 2022 voor Saxenda en aug 2022 voor Mysimba